

InterAPETOX

Estimulante del apetito y antianémico



COMPOSICIÓN

Fórmula | Cada 10.0 ml contiene:

Tiamina (vitamina B1)	1,00 mg
Sulfato Ferroso	140,00 mg
Riboflavina (vitamina B2)	1,00 mg
Piridoxina (vitamina B6)	0,50 mg
Cianocobalamina (vitamina B12)	5,00 mcg
Niacinamida (vitamina B3)	5,00 mg
Ácido pantoténico (D pantenol)	1,00 mg
Ácido ascórbico (vitamina C)	35,00 mg
BUCLIZINA	5,00 mg
Excipientes c.s.p.	10,0 ml

ESPECIES

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos, felinos y aves.

INDICACIONES

Indicado en casos de falta de apetito. La buclizina actúa como potente estimulante no hormonal del apetito y crecimiento. Recomendado como antianémico, vigorizante orgánico, deficiencias de vitaminas del complejo B. En requerimientos aumentados (preñez, lactancia, estados carenciales, estrés). En caso de desnutrición, nerviosismo, convalecencia. Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

Nota: puede administrarse en el agua de bebida, en este caso, su consumo debe ser en menos de 24 horas.

Bovinos y Equinos: 20 ml/100 Kg
Porcinos, ovinos y caprinos: 5 ml/20 Kg
Caninos cachorros: 5 ml hasta 30 Kg
Caninos adultos: 5 - 10 ml sobre 30 Kg
Felinos: 2 - 5 ml según tamaño
Aves: 100 ml/ 100 Litros de agua

0.16 ml/Kg de PV en caninos, felinos y aves

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a algunos de los componentes, no usar en animales con hipervitaminosis.

ANTÍDOTO

No existe un antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y fresco, protegido de la luz a Temperatura no mayor a 30 °C. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

VENTA

Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Interapetox

Gotero 20 ml

100 ml

VITAMÍNICOS ORALES

